



پزشکی علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی  
استان چهارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

## پایداری داروهای مخدر موجود در بخش های درمانی



ویرایش سوم: سال 1401

تهیه و تنظیم: دکتر حجت روحی بروجنی (مسئول بخش مراقبت های دارویی)  
دکتر ندا ساسان پور (مسئول فنی بخش مراقبت های دارویی)

اعضای کمیته بازنگری:

دکتر رسول رحیمی (سرپرست مرکز)

دکتر ندا ساسان پور (مسئول بخش مراقبت های دارویی)

دکتر راحیل مختاریان (مسئول فنی بخش مراقبت های دارویی)

دکتر فاطمه مومنی (مسئول فنی بخش مراقبت های دارویی)



ماکزیمم پایداری داروهای مخدر در بخش های درمانی با رعایت شرایط بهینه نگهداری به شرح ذیل است:

- 1- دمای محیط بایستی زیر 25 درجه سانتی گراد باشد.
- 2- دارو بایستی در قفسه مخصوص و دور از دسترس همگان قرار گیرد.
- 3- دارو بایستی دور از نور نگهداری شود.
- 4- پس از کشیدن داروی مخدر در سرنگ بایستی برچسب گذاری صحیح روی سرنگ انجام شود که این برچسب بایستی حاوی موارد ذیل باشد:

✓ نام دارو

✓ تاریخ و ساعت کشیدن دارو در سرنگ

پایداری در شرایط مذکور	دارو
دور از نور تا 8 ساعت	مدت زمان پایداری داروی مرفین
تا 24 ساعت	مدت زمان پایداری داروی پتدین
تا 18 ساعت	مدت زمان پایداری داروی فنتانیل