

عقرب گزیدگی

عقرب بیشتر در آب و هوا یگر موشبها فعال هستند در صورتی که اولین موجودی که با آن مواجه می شوید فرد آسیب دیده باشد مقدار سمی که وارد بدن می شود از ۵۰٪ بیشتر است

پس از چند دقیقه از گزش عقرب که عموماً در اندام (دست و پا) اتفاق می افتد، درد، تاول، قرمزی و تورم دیده می شود با گذشت چند ساعت از گزش علائمی مثل:

تند شدن نبض، بالا رفتن فشار خون، سرگیجه و تهوع استفراغ، تنگی نفس، تشنج، افزایش ترشح بزاق دیده می شود.

از علائم مهم عقرب گزیده بخصوص با عقرب

های اسکورپیونیده می توان همولیز گلبولهای قرمز و در نتیجه تغییر رنگ ادرار را ذکر کرد

با پیشرفت اثر سم در قسمت های مختلف، حرارت بدن بالا می رود و تا ۴۰ درجه می رسد همچنین ادرار بیمار نیز کم می شود که همین امر باعث نارسایی کلیه می شود.

حس بینایی مختل و نور شدید باعث ناراحتی بیمار می شود.

در کودکان کمتر از ۶ سال تشنج شایع است.

در عقرب گزیدگی اختلال های آزمایشگاهی و EGG وجود دارد.

علائم سیستمیک:

تشنج، همولیز شدید، تورم شدید سر و گردن (اگر محل گزش سر و گردن باشد) برافروختگی و قرمزی چشمها و صورت

تهوع استفراغ، نارسایی کلیه، آریتمی قلبی، پریاپیسم، استرایپسم، دیسترس تنفسی، کاهش فشار خون

درمان موضعی:

راههای مختلفی از قبیل تیغ زدن، مکیدن محل

گزش، کیسه یخ بستن تورنیکه

علاوه بر بستن درد در محل نیش با تزریق ۲ الی ۳

میلی لیتر لیدکائین درصد و تجویز سرم ضد عقرب

درمان سیستمیک :

در این بیماری بایستی علاوه بر سرم ضد عقرب نسبت به بررسی وضعیت عمومی بیمار و احتمال ایجاد همولیز شدید دقت کرد و آزمایش ادرار هر ۳ ساعت یکبار از نظر وجود هموگلوبین انجام شود مقدار سرم ضد عقرب به شدت مسمومیت بستگی دارد

در مورد مسمومیت شدید می توان تا ۶ آمپول سرم ضد عقرب تجویز کرد .

با اینکه این سرم تصفیه شده و عاری از مواد ناخالص است خطر شوک بخصوص در افراد حساس وجود دارد

هنگام تزریق سرم ضد عقرب ، یک میلی لیتر آدرنالین یک در هزار باید در سرنگ آماده باشد .

پیش و پس از تزریق سرم باید بیمار را گرم نگه داشت .

در اشخاص با سابقه تنگی نفس یا آلرژی ابتدا ۲/۱ از سرم ضد عقرب رقیق شده را در زیر جلد تزریق کرده و بیمار را به مدت ۳۰ دقیقه تحت نظر قرار می دهیم (دوبار این اقدام انجام گیرد) اگر واکنشی مشاهده نشد سرم آهسته تزریق گردد.

سوابق ایمن سازی بیمار باید بررسی گردد بنا بر احتیاط معمولاً واکسن کزاز (تتانوس) در مواقع عقرب گزیدگی و مارگزیدگی و گزش حیوان به فرد تزریق می گردد.

یا من اسمه دواء و ذكره شفاء



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان چهارمحال بختیاری

عنوان :
عقرب گزیدگی



Email:kashani@skums.as.ir

گرد آورنده و تنظیم :

رضوان موسوی ندا طاهری

تایید کننده : دکتر عبدالکریم صانعی

کد پمفلت: KH/PE/EM/509

طراحی و تدوین : واحد آموزش

بازنگری 1402

زیر نظر واحد آموزش مرکز