


بیمارستان سیدالشہداء(ع) فارسان



تزریق انسولین

بیمار گراما:

پیشنهاد می‌کرد که در دست دارید طبق اطلاعات ضروری در خصوص این انسولین را بازخوانی کنید. این اطلاعات ضروری در خصوص انسولین را در قسمت خنک این انسولین قرار دهد.

تهیه و تنظیم: واحد آموزش سلامت

با همکاری: سوپر وایز آموزش کارکنان

تاریخ بازنگری: خرداد ۱۴۰۲

کد پمفت: IQF-۱۴۵

بیرون از یخچال و دمای ۸-۲۵ سانتی گراد نگهداری می‌شود.

انسولین در حال استفاده را مجدداً "داخل یخچال نگذاشته و از نور خورشید و آفتاب نیز محافظت کنید.

قلمهای انسولین ذخیره در یخچال نگهداری می‌شوند. چنانچه قرار است قلم جدیدی استفاده شود دو ساعت قبل از یخچال خارج شود.

جهت پیشگیری از یخ زدگی انسولین را در قسمت خنک یخچال قرار دهید.

منابع: زهرا فتوکیان - آموزش به بیمار و خانواده

با آرزوهای بهبودی و سلامتی روزافزون

تلفن ۰۳۸۳۳۲۳۳۰۱۷-۱۹

اکنون شیشه انسولین را به طرف بالا و سرنگ را به طرف پایین نگه دارید.

برای اینکه بعداً بتوانید هوای داخل سرنگ را خارج کنید ابتدا ۳ تا ۴ واحد بیشتر از مقدار تجویز شده انسولین وارد سرنگ کنید برای خارج کردن هوای داخل سرنگ، آهسته چند ضربه به سرنگ بزنید و سپس انسولین اضافی و هوای داخل سرنگ به آرامی داخل شیشه انسولین وارد کنید سپس محل تزریق را آماده کنید.

در همان محلی که پوست را به طرف بالا کشیده اید سرنگ را با زاویه ۴۵ درجه افراد چاق با زاویه ۹۰ درجه وارد کنید و سپس پیستون سرنگ را کاملاً فشار داده و بدین ترتیب انسولین را وارد بافت کنید. در صورت استفاده از الکل اجازه دهید پوست بعد از تمیز کردن با الکل کاملاً خشک شود. با انگشت اشاره و شست دست چپ (مثل نیشگون گرفتن) پوست را جمع کنید. سرنگ را مثل مداد درست بگیرید. سرنگ را بطور عمودی یا با زاویه ۴۵ درجه وارد پوست کنید. پیستون را تا هفتمین سوزن را از پوست خارج کنید و پنبه را به مدت چند ثانیه روی محل تزریق فشار دهید.

تزریق با قلم انسولین

انسولینهای LANTUS و NOVORAPID کاملاً شفاف و انسولین NOVO MIX به صورت یکنواخت و بدون ذرات کریستال باشد. انسولین در حال مصرف

انسولین چیست

هورمونی است که در لوزالمعده ساخته و ترشح می شوددر صورت افزایش میزان قند خون ، انسولین بیشتری وارد خون می شود و به این وسیله موجب کاهش قند خون می شود . در افراد دیابتی ترشح انسولین کاهش یافته یا اینکه اصلاح ترشح نمی شود و در نتیجه میزان قندخون افزایش می یابد.

أنواع انسولين و آماده سازی آن
نوع رگولاتر که رنگ آن شفاف است .

انسولین کوتاه مدت یا ریگولاتر (شروع اثر نیم تا یک ساعت ، اوج اثر انسولین ۲-۳ ساعت بعد از تزریق طول اثر پنج تا هشت ساعت)

طولانی مدت NPH

نوع (NPH) که شیری رنگ کدر است.

این نوع انسولین ۱-۲ ساعت بعد از تزریق شروع به اثر می کند، ۴-۱۰ ساعت بعد از تزریق به اوج اثر خود می رسد و تا ۱۰-۱۶ ساعت بعد از تزریق هم در بدن باقی می ماند

برای کشیدن انسولین ابتدا انسولین شفاف و سپس شیری رنگ را بکشید.

مراقبتهای لازم جهت نگهداری ومصرف انسولین

انسولین مصرفی را در جای خنک- نگهداری کنید

تزریق مداوم در یک محل موجب سفت شدن پوست آن قسمت خواهد شد. جذب از طریق پوست شکم سریع تراز پوست ران است. صحنه ها انسولین را روی شکم و شب ها در ران تزریق کنید.

چهار محل اصلی تزریق شامل:

شکم - سطح پوست بازوها - سطح جلوی رانها - باسن برای جلوگیری از گود شدن یا سفت و برجسته شدن محل تزریق در هر بار محل تزریق را جابجا کنید. مثلاً تزریق اول در بازوی راست بعدی در بازوی چپ بعدی در راست شکم و سپس چپ شکم بعدی ران راست و سپس ران چپ و بعد در باسن یا دوباره در بازوی راست در محلی ۲ سانتیمتر پایین تراز محل تزریق قبل می توان انسولین را تزریق کرد روش دیگر استفاده از یک ناحیه مشخص در زمان مشخصی از روز است مثلاً تزریق صبح در ناحیه شکم و تزریق عصر در بازو ها و ران ها انجام گیرد

روش صحیح تزریق انسولین

شیشه انسولین و سرنگ آماده باشد در صورتی که از انسولین (NPH - کدر) برای تزریق استفاده می کنید برای مخلوط شدن یکنواخت کریستالهای موجود شیشه انسولین را چند بار بین دو دست خود بغلطانید

به اندازه مقدار انسولین تجویز شده ، هوا وارد سرنگ کنید.

از بین زدن انسولین خودداری شود.

از تزریق انسولین تاریخ گذشته خودداری کنید قبل از مصرف، حتماً انسولین را از نظر شفافیت کنترل کنید انسولین راهر روز سراسعت مشخص و قبل از خوردن و عده غذایی اصلی تزریق کنید.

از تزریق انسولین سرددخودداری نمایید. قبل از کشیدن انسولین ویال آن را بین کف دو دست به آرامی بگردانید و محل ورود سر سوزن را با پنبه آغشته به الکل ضد عفنونی کنید.

تنظیم میزان انسولین دریافتی بایستی توسط پزشک معالج انجام شود ، از کم و زیاد کردن خودسرانه میزان انسولین جدا خودداری کنید.

سرنگ انسولین ۵۹ خط دارد که هر خط، ۲ واحد انسولین میباشد. اگر لازم است از دو نوع (استفاده شود ابتدا انسولین معمولی و سپس انسولین NPH) را وارد سرنگ نمایید. مدت زمانیکه از مخلوط دونوع انسولین در یک سرنگ تازمان تزریق میگذرد نباید بیش از ۵-۱۵ دقیقه باشد

برای بیمارانی که در مخلوط کردن انسولین مشکل دارند توصیه می شود از انسولین مخلوط آماده استفاده کنند.

انسولین را در زیر پوست و در بافت چربی تزریق کنید. محل تزریق را به طور مرتب تغییر دهید