

راهنمای استفاده از سدیم استیوگلوکونات برای استفاده در بیماران مبتلا به لیشمانیوز

سدیم استیوگلوکونات یکی از ترکیبات آنتی مو آن می باشد که برای درمان بیماران مبتلا به لیشمانیوز (پوستی و احشایی) مورد استفاده قرار می گیرد. نوعی که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد به سفارش مرکز مدیریت بیماری ها و توسط سازمان غذا و دارو تهیه شده است. این فراورده در کارخانه BRAWN و در کشور هند تولید شده است. این محلول در دمای کمتر از ۲۵ درجه نگهداری می شود ولی نباید فریز شود. بایستی با رعایت نکات ایمنی و ضدعفونی مناسب درب ویال، تمام محلول برای چند نوبت مورد استفاده قرار گیرد.

در هر تزریق موضعی از یک سرنگ جدید استریل استفاده گردد. به طور مثال چنانچه در اطراف یک ضایعه ۳ تزریق انجام می شود از ۳ سرنگ استریل استفاده گردد.

ویال سدیم استیوگلوکونات موجود دارای حجم ۳۰ میلی لیتر می باشد و هر میلی لیتر آن دارای ۱۰۰ میلیگرم آنتی مو آن می باشد.

این دارو را می توان به طور موضعی، عضلانی و وریدی تجویز کرد. در درمان سیستمیک استفاده عضلانی آن بیشتر توصیه می شود. با توجه به احتمال وجود ذرات ۲۰ تا ۳۰۰ میکرونی در ویال توصیه می شود بلافاصله قبل از تجویز وریدی دارو از فیلتر ۵ میکرونی استریل و مناسب عبور داده شود. اگر امکان آن وجود ندارد خطر و فواید مصرف فیلتر نشده آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقدار مصرف سیستمیک ۲۰ میلی گرم آنتی مو آن (۰/۲ میلی لیتر) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه می باشد. در واقع به ازای هر ۱۰ کیلو وزن بیمار ۲ میلی لیتر (حداکثر ۱۲ میلی لیتر) تجویز می شود. برای مصرف موضعی معمولاً ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم (۱ تا ۵ میلی لیتر) به صورت یک بار در هفته موضعی تجویز می شود. (۰/۱ میلی لیتر در هر ساعتی متر مربع ضایعه)

موارد عدم مصرف

در موارد زیر بیمار به پزشک متخصص ارجاع و درمان با نظر ایشان انجام می شود:

- نارسایی کلیه
- سابقه عوارض واکنشی شدید به تجویز قبلی
- پنومونی
- بیماری های کبدی
- بیماری های قلبی و فشار خون
- خانم ها باردار و شیرده
- کودکان کمتر از ۱۸ ماه

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران به بخش درمان سالک مراجعه شود.