

راهنمای استفاده از داروی خوراکی میلنفوسین برای درمان بیماران مبتلا به کالا آزار :

این دارو برای بیمارانی که دو دوره درمان گلوکانتیم دریافت کرده اند و علائم هنوز پا برجاست و یا عود کرده بکار می رود لذا به همراه درخواست دارو کلیه پرونده های درمانی بیمار و نسخه پزشک ارسال گردد .

- دارو خوراکی و بصورت کپسولهای ۱۰ و ۵۰ میلی گرمی وجود دارد .

- این دارو برای کودکان زیر دو سال و زنان باردار تجویز نمی شود.

- با توجه به خطر بالقوه این دارو برای جنین ، خانمهایی که در سنین باروری هستند بایستی قبل از تجویز دارو تست بارداری انجام دهند و تا سه ماه پس از پایان درمان باردار نشوند.

مقدار مصرف دارو:

- برای کودکان (۱۱-۲ سال) : به مقدار ۲/۵ mg میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن

بدن در هر روز - شامل یک کپسول ۵۰ میلی گرمی بعد از غذا به مدت ۲۸ روز

- برای سنین ۱۲ سال و بالاتر با وزن کمتر از ۲۵ کیلو گرم : به مقدار ۵۰ mg روزانه

شامل یک کپسول ۵۰ میلی گرمی در صبح بعد از غذا به مدت ۲۸ روز

- برای سنین ۱۲ سال و بالاتر با وزن ۵۰-۲۵ کیلو گرم : به مقدار ۱۰۰ mg روزانه

شامل یک کپسول ۵۰ میلی گرمی در صبح بعد از غذا و یک کپسول ۵۰ میلی گرمی

در شب بعد از غذا به مدت ۲۸ روز. (۲ کپسول ۵۰ میلی گرمی در روز)

- برای سنین ۱۲ سال و بالاتر با وزن بیشتر از ۵۰ کیلو گرم : به مقدار ۱۵۰ mg

روزانه - شامل یک کپسول ۵۰ میلی گرمی در صبح بعد از غذا ، یک کپسول ۵۰ میلی

گرمی در ظهر بعد از غذا و یک کپسول ۵۰ میلی گرمی در شب بعد از غذا به مدت ۲۸

روز. (۳ کپسول ۵۰ میلی گرمی در روز)

عوارض جانبی دارو :

عوارض این دارو نسبت به درمانهای رایج برای درمان کالا آزار خفیف است و در ۹۸٪ موارد عوارض جانبی ندارد . دارو ممکن است باعث استفراغ در بیمار شود ولی استفراغ بلافاصله بعد از مصرف دارو رخ نمی دهد و شدید نیست و در چند روز پس از شروع مصرف دارو پدید می آید . می باشد . در هر گونه پیدایش راشهای پوستی و یا افزایش علائم گوارشی دارو بایستی با نظر پزشک قطع گردد و بیمار به متخصص ارجاع شود.

