

BRIEF REPORT

Comparing Serum Procalcitonin Levels Between Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Patients with Acute Exacerbation of Asthma

Mehdi Farmani¹,
Milad Shahini Shams Abadi²,
Ali Ahmadi³,
Mohammad-Hassan Arjmand⁴,
Akbar Soleimani⁵,
Zahra Habibi Dastenaei⁵

¹ Resident in Internal Medicine, Hajar Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

² Assistant Professor, Department of Microbiology, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

³ Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

⁴ PhD in Clinical Biochemistry, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

⁵ Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

(Received October 6, 2022 ; Accepted August 1, 2022)

Abstract

Background and purpose: Serum procalcitonin (PCT) indicates a bacterial infection that can reduce the administration of antibiotics. The aim of this study was to compare serum procalcitonin levels in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma and its relationship with lung function and inflammatory factors.

Materials and methods: In this cross-sectional study, patients with acute exacerbation of asthma (n= 46) and COPD (n= 23) attending Shahrekord Kashani Hospital were included. After obtaining clinical and demographic information, the participants underwent spirometry and the levels of procalcitonin, ESR, white blood cell and PMN counts were determined. Data were analyzed in SPSS V19.

Results: There were significant differences between patients with exacerbation of COPD and asthma in age, sex, ICU hospitalization, and FEV1 percentage ($P <0.05$) but no significant differences were seen in mean ESR, WBC and PMN ($P> 0.05$). PCT results in asthma and COPD patients were 8.7% and 56.5%, respectively ($P<0.05$). Logistic regression analysis showed that gender and FEV1 had significant effects on PCT level (odds ratio 0.192 and 0.958, respectively ($P<0.05$)).

Conclusion: Procalcitonin in patients with exacerbation of COPD was significantly higher than that in patients with exacerbation of asthma, which indicates the role of exacerbation of bacteria in COPD.

Keywords: acute exacerbation of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, procalcitonin, ESR, PMN

J Mazandaran Univ Med Sci 2022; 32 (212): 140-146 (Persian).

Corresponding Author: Zahra Habibi - Clinical Research Development Unit, Hajar Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran. (E-mail: dr_Z_habibi@yahoo.com)

مقایسه سطح پروکلستیونین سرم در بیماران با تشید حاد بیماری مزمن انسدادی ریه و بیماران با تشید حاد آسم

مهند فرمانی^۱

میلاد شاهینی شمس آبادی^۲

علی احمدی^۳

محمد حسن ارجمند^۴

اکبر سلیمانی^۵

زهرا حبیبی دستنایی^۶

چکیده

سابقه و هدف: پروکلستیونین سرم (PCT) نشانگر عفونت باکتریایی است که می‌تواند تجویز آنتی‌بیوتیک را کاهش دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه پروکلستیونین سرم در بیماران با تشید حاد COPD و آسم و ارتباط آن با عملکرد ریه و فاکتورهای التهابی انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، بیماران با تشید حاد آسم (۴۶ نفر) و COPD (۲۲ نفر) مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهر کرد، در سال ۱۳۹۹، وارد مطالعه شدند و پس از کسب اطلاعات کلینیکی و دموگرافیک، تحت اسپیرومتری قرار گرفته و پروکلستیونین، ESR، گلبول‌های سفید و PMN نمونه خون آن‌ها تعیین شد. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: بیماران با تشید COPD و آسم بر حسب سن، جنس، بستری در ICU و درصد FEV1 تفاوت معنی‌داری داشتند ($P < 0.05$) ولی بر حسب میانگین ESR، WBC و PMN تفاوت معنی‌داری نداشتند ($P > 0.05$). نتایج PCT مثبت نیز در گروه‌های آسم و COPD به ترتیب ۸/۷ و ۵۶/۵ درصد بود که تفاوت معنی‌داری داشت. در آنالیز رگرسیون لجستیک، متغیرهای جنسیت و FEV1 اثر معنی‌داری بر سطح PCT داشتند (نسبت شانس ۰/۱۹۲ و ۰/۹۵۸).

استنتاج: پروکلستیونین در بیماران با تشید COPD بیشتر از بیماران با تشید آسم بوده است که نشان‌دهنده نقش تشید باکتریایی در COPD می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تشید حاد آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه، پروکلستیونین، ESR، PMN

مقدمه

بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یک بیماری اغلب پیش‌رونده مسیرهای هوایی شناخته می‌شود(۱). قابل پیشگیری و درمان است که با محدود شدن مزمن و

E-mail: dr_Z_habibi@yahoo.com

مؤلف مسئول: زهرا حبیبی - شهر کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، بیمارستان هاجر

۱. دستیار داخلي، بیمارستان هاجر، دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد، شهر کرد، ایران

۲. استادیار، گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهر کرد، ایران

۳. دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهر کرد، ایران

۴. دکترای بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهر کرد، ایران

۵. استادیار، گروه داخلي، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهر کرد، ایران

۶. تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۷/۱۴ تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۸/۱۲ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۴۰۰/۸/۱۰

باشند، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح پروکلیستونین سرم در این دو گروه از بیماران و ارتباط آن با سطوح فاکتورهای التهابی و یافته‌های اسپیرومتری صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر یک توصیفی-تحلیلی از نوع مقطوع است. در این مطالعه بیماران با تشید حاد آسم و COPD مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهر کرد در سال ۱۳۹۹ که دارای معیارهای ورود بوده‌اند، وارد مطالعه شدند (کد اخلاق: IR.SKUMS.REC.1398.051). تشخیص آسم و COPD بر اساس شرح حال، معاینه بالینی و اسپیرومتری بود. تشید آسم یا COPD بر اساس، نیاز به کورتیکواسترۆئیدهای سیستمیک یا افزایش دوز نگهدارنده پایدار برای حداقل ۳ روز، و بسترهای شدن در بیمارستان یا مراجعه اورژانس به دلیل تشید بیماری که نیازمند دریافت کورتیکواسترۆئیدهای سیستمیک است، صورت گرفت. معیارهای ورود شامل محدوده سن ۱۸ تا ۷۰ سال، تشخیص تشید حاد آسم و COPD و رضایت‌جهت شرکت در مطالعه و معیارهای خروج شامل، استفاده از آنتی‌بیوتیک در طی دو هفته اخیر، نقص سیستم ایمنی شدید، نارسای قلبی، فیروز کیستیک، سل فعال، حاملگی و پنومونی تایید شده با رادیوگرافی قفسه سینه، بوده است. از بیماران واجد شرایط نمونه خون اخذ شد و پس از انتقال به آزمایشگاه و جدا کردن جز سرمی سطوح پروکلیستونین و CRP توسط کیت‌های مخصوص به روش ELIZA مورد سنجش قرار گرفت. همچنین نمونه اسمایر خون جهت شمارش گلوبول‌های سفید و PMN تهیه شد و اسپیرومتری جهت تعیین میزان FEV1 انجام گرفت. داده‌ها بعد از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ شده و براساس آمار توصیفی فراوانی و درصد برای متغیرهای کیفی و میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و همچنین آزمون‌های کای اسکور و تی تست تجزیه و تحلیل شد.

سطح جهانی تحت تأثیر قرار داده است (۴/۸ درصد از جمعیت) و پس از بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان و بیماری‌های عروقی مغز چهارمین علت مرگ و میر است (۳،۲).

آسم نیز یک بیماری التهابی مزمن مجاری هوایی است که ویژگی‌های آن شامل، علائم متغیر و عود کننده، انسداد برگشت‌پذیر جریان هوا و اسپاسم برونش است (۴). آسم در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۶۲ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده، و باعث ۴۶۱۰۰۰ مرگ شده است که بیشتر موارد آن در کشورهای در حال توسعه بوده است (۵). تشیدهای حاد آسم و COPD بار مالی فراوانی به سیستم‌های مراقبت بهداشتی تحمیل می‌کنند و سهم بالایی از مصرف آنتی‌بیوتیک را به خود اختصاص می‌دهند (۶). یکی از استراتژی‌های اخیر برای کاهش استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، توسعه الگوریتم‌های درمانی با استفاده از نشانگرهای زیستی است که در آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس سطح نشانگرهای زیستی اندازه گیری شده در خون تجویز می‌گردد (۷،۸). پروکلیستونین سرم (PCT) یک پروتپتید گلیکوپروتئینی و نشانگر عفونت است که سطح PCT سرمی آن طی عفونت باکتریایی افزایش می‌باید (۹). مشاهده شده است که درمان آنتی‌بیوتیکی با هدایت پروکلیستونین سبب کاهش تقریباً ۵۰ درصد مصرف آنتی‌بیوتیک در بیماران بسته شده است (۱۰،۱۱). همچنین مطالعات ارتباط معنی‌داری را بین پروکلیستونین سرم با تشید COPD و فاکتورهای التهابی و یافته‌های اسپیرومتری گزارش کرده‌اند، با این حال برخی دیگر ارتباط معنی‌داری را بین پروکلیستونین و تشید آسم و COPD و همچنین تشید عفونی / غیر عفونی و تشید باکتریایی / ویروسی مشاهده نکرده‌اند (۱۲-۱۳،۶). با توجه به این که علل تشید بیماری در COPD و آسم متفاوت است و عوامل مختلفی همچون باکتری‌ها، ویروس‌ها و یا سایر عوامل پاتогن می‌توانند در ایجاد این بیماری‌ها نقش داشته

ارتباط PCT سرم با متغیرهای مورد بررسی بر حسب آنالیز رگرسیون لجستیک در جدول شماره ۳ نشان داده شده است. با کنترل متغیرهای مخدوش کننده و در نظر گرفتن همزمانی تاثیر متغیرهای همراه، متغیری که اثر معنی داری بر سطح PCT دارد، جنسیت و FEV1 (به نسبت شانس ترتیب ۰/۹۵۸ و ۰/۱۹) بوده است.

جدول شماره ۳: ارتباط PCT سرم با متغیرهای مورد بررسی بر حسب آنالیز رگرسیون لجستیک

متغیر	استاندارد	B	خطای آماره Wald	df	نسبت شانس (Exp(B))	معنی داری	سطح
ESR	- ۰/۰۱۴	- ۰/۰۱۴	۰/۱۷۷	۱	۰/۹۸۶	۰/۷۲۱	
WBC	- ۰/۰۴۱	- ۰/۰۴۱	۰/۱۱۷	۱	۰/۹۶	۰/۷۷۲	
FEV1	- ۰/۰۴۳	- ۰/۰۱۸	۰/۰۵۶	۱	۰/۹۵۸	* ۰/۰۱۸	
Age	- ۰/۰۱۰	- ۰/۰۱۰	۰/۰۸۷	۱	۰/۹۹۰	۰/۷۶۸	
Sex(1)	- ۱/۰۵	- ۰/۰۷۸	۰/۰۴۳	۱	۰/۹۴۲	* ۰/۰۳۱	
Constant	۲/۹۵	۲/۹۵	۱/۹۴	۱	۰/۹۳۸	۰/۷۲۰	

در این مطالعه ۴۶ بیمار با تشخیص تشدید حاد آسم و ۲۳ بیمار با تشخیص تشدید حاد COPD بررسی شدند که نتیجه PCT مثبت در گروههای آسم و COPD به ترتیب ۸/۷ و ۵۶/۵ درصد بود که تفاوت معنی داری داشت و نشان دهنده افزایش آن در گروه COPD است. میانگین PCT نیز در گروه با تشدید حاد COPD (۰/۴۵) به طور معنی داری بیشتر از گروه با تشدید حاد آسم (۰/۲۶) بود. همسو با مطالعه حاضر در مطالعه Bafadhel و همکاران، سطح PCT سرم در بیماران با تشدید COPD، تشدید آسم و درصد بیماران با تشدید COPD کم تراز مقادیر قابل تشخیص بود^(۶). یک cut-off مشخص برای PCT جهت نشان دادن وجود عفونت باکتریایی مشخص شده است^(۹). با توجه به این که ۵۰-۷۰ درصد موارد تشدید حاد COPD ناشی از عفونت باکتریایی است، ولی ۵۰-۸۰ درصد موارد تشدید آسم ناشی از عفونت های ویروسی است که بیشتر بودن مقادیر PCT در بیماران COPD دور از ذهن نیست^(۱۵, ۱۶).

یافته ها و بحث

در مطالعه حاضر، ۴۶ بیمار با تشخیص تشدید حاد آسم و ۲۳ بیمار با تشخیص تشدید حاد COPD وارد مطالعه شدند. توزیع جنسی و فراوانی بستری در ICU در دو گروه با تشدید حاد آسم و COPD تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر داشت ($P < 0/05$). نتایج PCT مثبت نیز در گروههای آسم و COPD به ترتیب ۸/۷ و ۵۶/۵ درصد بود که تفاوت معنی داری داشت ($P < 0/05$).

جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: مقایسه فراوانی جنسیت، بستری در ICU و نتایج PCI در گروههای مورد مطالعه

جنسیت	مرد	زن	کل	بستری در ICU	آسم	COPD	متغیر	سطح
	۳۰ (۶۰/۲)	۱۶ (۴۰/۹)	۴۶ (۳۴/۱)	۱ (۱۰/۰)	۴۶ (۱۰/۰)	۳۰ (۳۴/۰)	متغیر	سطح
*	۳۰ (۶۰/۲)	۱۶ (۴۰/۹)	۴۶ (۳۴/۱)	۱ (۱۰/۰)	۴۶ (۱۰/۰)	۳۰ (۳۴/۰)	متغیر	سطح
۰/۰۰۱	۱ (۲/۲)	۱۶ (۴۹/۶)	۴۵ (۹۷/۸)	۱ (۱۰/۰)	۴۶ (۱۰/۰)	۴۶ (۹۷/۸)	متغیر	سطح
*	۱ (۲/۲)	۱۶ (۴۹/۶)	۴۵ (۹۷/۸)	۱ (۱۰/۰)	۴۶ (۱۰/۰)	۴۶ (۹۷/۸)	متغیر	سطح
۰/۰۰۱	۱ (۲/۲)	۱۶ (۴۹/۶)	۴۵ (۹۷/۸)	۱ (۱۰/۰)	۴۶ (۱۰/۰)	۴۶ (۹۷/۸)	متغیر	سطح
*	۱ (۲/۲)	۱۶ (۴۹/۶)	۴۵ (۹۷/۸)	۱ (۱۰/۰)	۴۶ (۱۰/۰)	۴۶ (۹۷/۸)	متغیر	سطح

*: نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح $P < 0/05$

براساس نتایج جدول شماره ۲، میانگین سن و PCT سرم در گروه با تشدید حاد COPD به طور معنی داری بیشتر از گروه با تشدید حاد آسم بود ($P < 0/05$)، ولی میانگین ESR، WBC و PMN در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. میانگین FEV1 نیز در گروه با تشدید حاد COPD به طور معنی داری کمتر از گروه با تشدید حاد آسم بوده است ($P < 0/05$).

جدول شماره ۲: مقایسه میانگین سن، شاخصهای التهابی، PCI و FEV1 در گروههای مورد مطالعه

متغیر	آسم	COPD	سن (سال)
	گروه آسم	انحراف معیار \pm میانگین	انحراف معیار \pm میانگین
*	۵۸/۰/۹ \pm ۱۳/۴۸	۶۴/۳/۹ \pm ۹/۶۶	۵۸/۰/۹ \pm ۱۳/۴۸
۰/۰۵	۱۸/۰/۷ \pm ۱۶/۷۷	۱۹/۰/۰ \pm ۴/۳۲	۱۸/۰/۷ \pm ۱۶/۷۷
۰/۸۹	۹/۶ \pm ۳/۲۸	۸/۸/۲ \pm ۲/۲۸	۹/۶ \pm ۳/۲۸
۰/۷۵۸	۹۶/۱/۳ \pm ۸/۱۶	۹۷/۱/۳ \pm ۸/۱۶	۹۶/۱/۳ \pm ۱۱/۸۸
۰/۰۱۶	۰/۱۶ \pm ۰/۱۲	۰/۱۵ \pm ۰/۲۰	۰/۱۶ \pm ۰/۱۲
*	۰/۱۶ \pm ۱۲/۲۵	۵۳/۲/۶ \pm ۱۳/۴۵	۰/۱۶ \pm ۱۲/۲۵
۰/۰۰۱	۸۶/۸/۲ \pm ۱۲/۲۵	۸۶/۸/۲ \pm ۱۲/۲۵	۸۶/۸/۲ \pm ۱۲/۲۵

*: نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح $P < 0/05$

حرارت، تعداد لکوسیت، CRP، ESR، FEV1 و مدت بستری در بیمارستان داشت(۱۲). در مطالعه Cantürk و همکاران در سال ۲۰۰۸، روی بیماران با تشید COPD، همبستگی معنی‌داری بین سطح سرمی PCT و ESR مشاهده شد، ولی ارتباط معنی‌داری بین سطح سرمی PCT و تعداد گلوبول‌های سفید خون بیماران وجود نداشت(۹). مطالعات گذشته پیشنهاد داده اند که پروگلیسیتونین می‌تواند یک بیومارکر مناسب در تشید COPD استفاده شود(۱۷،۱۸). همچنین با توجه به نتایج میزان پروگلیسیتونین در گروه‌های آسم و COPD در مطالعه حاضر به نظر می‌رسد پروگلیسیتونین یک بیومارکر مناسب برای تشید COPD باشد. در مطالعه Hatherill و همکاران نیز گزارش شد که CRP، ESR و گلوبول‌های سفید که از پارامترهای موجود برای تشخیص التهاب هستند، حساسیت و ویژگی کم‌تری نسبت به PCT در تمایز عفونت حاد باکتریایی از سایر انواع التهاب غیرباکتریایی دارند(۱۹).

بر اساس یافته‌های مطالعه میانگین PCT و فراوانی PCT و فراوانی بستری در ICU در بیماران با تشید COPD نسبت به بیماران با تشید آسم بیش تر و درصد FEV1 نیز کم‌تر FEV1 باشد. بر اساس آنالیز رگرسیون لجستیک PCT با ارتباط معنی‌داری داشت ولی با ESR و WBC ارتباط معنی‌داری نداشت. بنابراین مطالعات آتی بایستی به بررسی ارتباط PCT با تشید باکتریایی COPD و آسم پرداخته و کاربرد آن را در آتنی‌بیوتیک درمانی هدفمند ارزیابی گردد.

سپاسگزاری

مطالعه حاضر در کمیته اخلاق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شماره IR.SKUMS.REC.1398.051

در مطالعه حاضر میانگین FEV1 در گروه با تشید COPD (۵۳/۲۶) به طور معنی‌داری کم‌تر از گروه با تشید حاد آسم (۸۶/۸۲) بود. علاوه بر این بستری در ICU نیز در گروه با تشید COPD بیش‌تر از گروه با تشید آسم بود (به ترتیب ۲/۲ و ۳۰/۴ درصد) که نشان‌دهنده شدیدتر بودن بیماری در بیماران با تشید COPD است. در مطالعه Bafadhel و همکاران در سال ۲۰۱۱، روی بیماران با تشید آسم و COPD، مدت بستری دو گروه تفاوت معنی‌داری داشته و مدت بستری در بیماران با تشید COPD (۵ روز) بیش‌تر از بیماران با تشید آسم (۲ روز) بوده است(۶). در مطالعه Yamauchi و همکاران در سال ۲۰۱۵ روی بیماران با تشید آسم و COPD، مدت بستری در بیمارستان، مدت بستری در ICU و فراوانی بستری در ICU، تهويه مکانيکي و مرگ و مير در بیماران با تشید COPD نسبت به بیماران با تشید آسم به طور معنی‌داری بیش‌تر بوده است(۱۶).

در آنالیز رگرسیون لجستیک با کنترل متغیرهای مخدوش کننده و در نظر گرفتن همزمانی تاثیر متغیرهای PCT همراه، متغیرهایی که اثر معنی‌داری بر سطح FEV1 داشتند، شامل جنسیت و FEV1 (نسبت شانس ۱۹۲/۰ و ۹۵۸/۰) بود و سایر متغیرها اثر معنی‌داری بر سطح PCT نداشتند. در مطالعه Randa و همکاران در سال ۲۰۱۶ روی ۵۲ بیمار با تشید حاد COPD مشاهده شد که سطح PCT سرم با نشانگرهای التهابی از قبیل میزان کل لکوسیت، ESR در ساعت اول و دوم و پروتئین واکنشی C و همچنین FEV1 ارتباط معنی‌داری ندارد(۱۱). در مطالعه Mohamed و همکاران در سال ۲۰۱۲ در بیماران COPD با تشید غیر باکتریایی PCT ارتباط معنی‌داری با لکوسیت، ESR، پروتئین واکنشی C و FEV1 نداشت ولی در بیماران با تشید باکتریایی سطح PCT در زمان تشید همبستگی معنی‌داری با درجه

References

- Stoltz D, Christ-Crain M, Bingisser R, Leuppi J, Miedinger D, Müller C, et al. Antibiotic Treatment of Exacerbations of COPD: A Randomized, Controlled Trial Comparing Procalcitonin-Guidance With Standard Therapy. *Chest* 2007; 131(1): 9-19.
- Adhikari TB, Acharya P, Höglund M, Neupane D, Karki A, Drews A, et al. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease and its associated factors in nepal: Findings from a community-based household survey. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2020; 15(2): 2319-2331.
- López-Campos JL, Tan W, Soriano JB. Global burden of COPD. *Respirology* 2016; 21(1): 14-23.
- Papaiwannou A, Zarogoulidis P, Porpodis K, Spyros D, Kioumis I, Pitsiou G, et al. Asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome (ACOS): current literature review. *J Thorac Dis* 2014; 6(Suppl 1): S146.
- Stern J, Pier J, Litonjua AA, editors. Asthma epidemiology and risk factors. Seminars in Immunopathology 2020; 42: 5-15.
- Bafadhel M, Clark TW, Reid C, Medina M-j, Batham S, Barer MR, et al. Procalcitonin and C-Reactive Protein in Hospitalized Adult Patients With Community-Acquired Pneumonia or Exacerbation of Asthma or COPD. *Chest* 2011;139(6):1410-1418.
- Briel M, Schuetz P, Mueller B, Young J, Schild U, Nusbaumer C, et al. Procalcitonin-guided antibiotic use vs a standard approach for acute respiratory tract infections in primary care. *Arch Intern Med* 2008; 168(18): 2000-2007.
- Salehi F, Ahmadi A, Ahmadi Soodejani Ss, Shahini Shams Abadi M. The changing trend of mortality caused by gastrointestinal cancers in Iran during the years 2006-2010. *Arq Gastroenterol* 2018; 55(3): 237-241.
- Cantürk T, Arzu B, Nuri K, Satılmış İ, Selim K, Metin Ö, et al. The importance of serum procalcitonin levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. *Turk J Med Sci* 2008; 38(2): 139-144.
- Burkhardt O, Ewig S, Haagen U, Giersdorf S, Hartmann O, Wegscheider K, et al. Procalcitonin guidance and reduction of antibiotic use in acute respiratory tract infection. *Europ Respirator J* 2010; 2(1): 601-607.
- Randa SM, Waleed MEI-S, Hisham HE, Abeer SM, Khaled EH. Effect of procalcitonin-guided therapy on antibiotic usage in the management of patients with chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation. *Egyptian J Bronchol* 2010; 36(3): 117-133.
- Mohamed KH, Abderabo MM, Ramadan ES, Hashim MM, Sharaf SM. Procalcitonin as a diagnostic marker in acute exacerbation of COPD. *Egypt J Chest Dis Tuberc* 2012; 61(4): 301-305.
- D'silva L, Hassan N, Nair P. Serum procalcitonin and infective exacerbations of asthma. *Chest* 2011; 140(5): 1389-1390.
- Gao D, Chen X, Wu H, Wei H, Wu J. The levels of serum pro-calcitonin and high-sensitivity C-reactive protein in the early diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease during acute exacerbation. *Exp Ther Med* 2017; 14(1): 193-198.
- O'Byrne PM, Pedersen S, Lamm CJ, Tan WC, Busse WW. Severe exacerbations and decline in lung function in asthma. *Am J Respir Crit Care Med* 2009; 179(1): 19-24.
- Yamauchi Y, Yasunaga H, Matsui H, Hasegawa W, Jo T, Takami K, et al. Comparison of

- in-hospital mortality in patients with COPD, asthma and asthma–COPD overlap exacerbations. *Respirology* 2015; 20(6): 940-946.
17. Titova E, Christensen A, Henriksen AH, Steinshamn S, Åsberg A. Comparison of procalcitonin, C-reactive protein, white blood cell count and clinical status in diagnosing pneumonia in patients hospitalized with acute exacerbations of COPD: A prospective observational study. *Chron Respir Dis* 2019; 16: 1479972318769762.
18. Pandey S, Garg R, Kant S, Verma A, Gaur P. Serum procalcitonin levels in chronic obstructive pulmonary disease patients in North Indian Population. *Ann Afr Med* 2019; 18(2): 103-107.
19. Hatherill M, Tibby SM, Sykes K, Turner C, Murdoch IA. Diagnostic markers of infection: comparison of procalcitonin with C reactive protein and leucocyte count. *Arch Dis Child* 1999; 81(5): 417-421.